

ANIOS OXY'FLOOR

Desinfektionsreiniger
für Böden und nicht
kritische Oberflächen



- Geruchloses Pulver
- Gleichzeitig reinigende und desinfizierende Wirkung
- Wirkt in 15 Minuten gegen *Clostridium difficile*
- Alternative zu Chlor
- Einzeldosis: verhindert eine Überdosierung

EINSATZBEREICH


Reinigung und Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum für Böden und nicht kritische Oberflächen (Arbeitsflächen, Beistelltische, Handläufe etc.). Nicht für die Aufbereitung von medizinischen Produkten zum Zweck ihrer Wiederverwendung geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Peressigsäure freisetzendes Pulver
- Weißes Pulver mit feiner Körnung
- Hygroskopisches Pulver (vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren)
- pH in Lösung (0.5%) in Leitungswasser: minimal 8 - maximal 10
- Dichte: 0,91
- Rezeptur ohne Perborat
- Verdünntes Produkt ohne charakteristischen Geruch
- Nach Verdünnung bläuliche Lösung
- Aufbewahrung der Lösung: 8 Stunden

PRODUKT ZUR
VERDÜNNUNG
25 g → 5 L





ANIOS OXY'FLOOR

Desinfektionsreiniger für Böden und nicht kritische Oberflächen


GEBRAUCHSANWEISUNG*



1

Einen Eimer mit 5 Litern lauwarmem Wasser befüllen. Verdünnung auf 0,5%: Eine 25-g-Dosis ANIOS OXY'FLOOR in den Eimer hinzugeben. Aufbewahrung der Lösung : 8 Stunden.

* Kein Nachspülen erforderlich, sofern die Oberfläche nicht mit Haut in Berührung kommt. Vor Verwendung der Oberflächen Produkt vollständig trocknen lassen.



2

Bodenreinigung im hinteren Bereich beginnen und wie in der Abbildung in Richtung Ausgang fortsetzen.



3

Putzlappen so oft wie möglich wechseln. Den schmutzigen Putzlappen in den hierfür vorgesehenen Behälter legen. Nach der Reinigung eines Bereiches den Putzlappen wechseln und die Reinigungslösung erneuern.

ZUSAMMENSETZUNG

Pulver auf Basis von Natriumpercarbonat, Tetraacetythyldiamin und N-Alkyl(C12-14)-N-benzyl-N,N-dimethylammoniumchlorid. Bedarfsmäßige Bildung von Peroxyessigsäure durch Verdünnung in Wasser. Wirkstoffzusammensetzung von 100g einer auf 0,5 % verdünnten Lösung:

- Kyselina peroctová (in situ) (Č. CAS 79-21-0): zhruba 750 ppm (0,75 mg/g),
- N-Alkyl(C12-14)-N-benzyl-N,N-dimethylammoniumchlorid (CASNr. 85409-22-9): 0,012 % (0,12 mg/g).

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Gefährlich. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch beachten (erarbeitet gemäß den geltenden europäischen Regelungen für die Klassifizierung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Biozide mit Vorsicht verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen durchlesen. Lagerung bei +5°C bis +30 °C. Biozidprodukt für die Desinfektion von Oberflächen (Gruppe 1-PT 2).

VERPACKUNGSEINHEITEN

- 100 Einzeldosen à 25 g.....2131.234
- 4 Eimer à 1 kg.....2131.732



Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

ANIOS OXY'FLOOR hat in einer Verdünnung von 0,5% die folgende antimikrobielle Wirksamkeit (unter hoher Belastung):

Wirksam gegen	Normen	Kontaktzeit
Bakterien	EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615. Gemäß EN 13727 und EN 13697 wirksamkeit auf BMR/BHR	5 Minuten
Mykobakterien	EN 14348, EN 13697, EN 14563	15 Minuten
Hefen	EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615	5 Minuten
Pilze	EN 13697, EN 16615 EN 13624, EN 1650	15 Minuten 20 Minuten
Viren	EN 14476 : Poliovirus EN 14476 : Adenovirus, MNV Gemäß EN 14476 wirksam gegen HIV-1, PRV (Modellvirus für HBV), Vaccinia virus, VRS Gemäß EN 14476, BVDV (Modellvirus für HCV) Gemäß EN 14476, Rotavirus	60 Minuten 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten
Sporen Bakterien	EN 13704 EN 14347, EN 13697 Gemäß EN 14347, EN 13704 und EN 16615, wirksam gegen Clostridium difficile	60 Minuten 30 Minuten 15 Minuten

Die vollständige Auflistung der antimikrobiellen Wirkungen kann der wissenschaftlichen Produktdokumentation entnommen werden, die auf einfache Anfrage erhältlich ist.



1

2

DE2131-181204 - Symbolfotos