Performance

Tolérance

Observance

ANIOSGEL 800

DOUCEUR ET PERFORMANCE

laboratoires ANIOS

Le professionnel de la désinfection

LORSQUE **OBSERVANCE** RIME AVEC **TOLÉRANCE**

Le critère essentiel pour un haut niveau d'observance est la tolérance cutanée lors d'utilisations répétées des produits hydroalcooliques.

La pertinence des composants optimise la tolérance cutanée[1][2][3] :

- L'Ethanol est le principe actif garantissant la meilleure synergie « efficacité / tolérance » par rapport à d'autres principes actifs ou d'autres alcools[4][5].
- Les agents émollients, cicatrisants et hydratants garantissent l'intégrité de la couche cornée de l'épiderme exposée aux agressions (fréquence des lavages, température de l'eau, essuyages...)[6].

Afin de s'inscrire dans cette démarche, les produits hydroalcooliques proposés doivent répondre aux critères d'efficacité ainsi qu'aux critères permettant d'assurer un niveau d'observance élevé de la pratique d'hygiène des mains[7]. En effet, c'est ce haut niveau d'observance qui permettra de réduire les IAS mais aussi de prévenir la propagation de la résistance microbienne.

La mise en place inconditionnelle des précautions standards et notamment de l'hygiène des mains avec un haut niveau d'observance permet de prévenir la diffusion des germes (hautement) résistants aux antibiotiques (MRSA, VRE, CRE, ESBL...)[8].

Notre expertise dans la conception de produits hydroalcooliques alliant « tolérance et efficacité » est confirmée par des tests réalisés sous contrôle dermatologique sur la formule ANIOSGEL 800 :

- Institut d'Expertise Clinique - France : In use test under dermatological control with evaluation of the efficacy
  - › Conclusion : bonne acceptabilité cutanée ; convient pour les peaux sensibles ; préserve le niveau d'hydratation de la peau
- Evic – Human repeated insult patch test with challenge (HRIPT)
  - › Conclusion : très bonne compatibilité cutanée

(1) *WHO guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009 – p62, 64.*
(2) *Larson et al Factors influencing handwashing behavior of patient care personnel. American Journal of Infection Control, 1982, 10:93–99.*
(3) *Nobile CG et al. Healthcare personnel and hand decontamination in intensive care units: knowledge, attitudes, and behaviour in Italy. Journal of Hospital Infection, 2002, 51:226–232.*
(4) *WHO guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009 – p61.*
(5) *De Haan P, Meester HHM, Bruynzeel DP. Irritancy of alcohols. In: Van der Valk P, Maibach H, eds. The irritant contact dermatitis syndrome. New York, NY, CRC Press,1996:65–70.*
(6) *WHO guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009 – p65.*
(7) *WHO résumé des recommandations de l'OMS pour l'hygiène des mains au cours des soins – FR – 2009 – p31.*
(8) *WHO - Antimicrobial resistance Global report on surveillance – 2014.*

DEPUIS **PLUS DE 30 ANS** NOUS PRENONS SOIN **DE VOS MAINS**

DE 1985 À 2015

1985
MANUSPRAY
Première solution hydroalcoolique Anios sur base Isopropanol.

1989
MANUGEL
Première formule gel sur base Isopropanol.

1995
MANUGEL PLUS NPC
Formule gel sur base de deux alcools (Isopropanol et Éthanol).

ANIOSGEL 800

UNE NOUVELLE RÉPONSE **À VOS EXIGENCES**

EXIGENCE DE CONFORT

ANIOSGEL 800 contient des agents protecteurs de la peau de qualité cosmétique :

- L'***alpha-bisabolol***, issu de Candeia (Vanillosmopis erythropapa), aux propriétés apaisante et cicatrisante.
- La ***glycérine végétale*** de qualité Pharmacopée Européenne, associée à un nouvel ***agent hydratant de type Polyol***, confère une hydratation optimale des couches supérieures de l'épiderme.
- L'effet émollient et surgraissant de la peau est assuré par un ***glycéride d'acide gras***.
- L'***éthanol*** d'origine agricole assure l'efficacité antimicrobienne d'ANIOSGEL 800.

EXIGENCE D'EFFICACITÉ

ANIOSGEL 800 présente un spectre antimicrobien bactéricide, mycobactéricide, fongicide et virucide, conforme aux dernières normes en vigueur.

En accord avec les recommandations de l'O.M.S.* : 80% p/p (soit 83.8% v/v)

ACTIF SUR	NORMES
Bactéries	EN 1040, EN 13727 (2013) : 30 sec Selon EN 13727 (2013) sur BMR et BHR (K. pneumoniae OXA 48, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, S. aureus SARM) : 30 sec
Mycobactéries	EN 14348 : 30 sec
Levures et Moisissures	EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec
Virus	EN 14476 (2013) sur Poliovirus : 60 sec ; Adenovirus et Norovirus MNV : 30 sec Selon EN 14476 sur BVDV (virus modèle HBV), PRV (virus modèle HCV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus : 30 sec
Désinfection hygiènique	EN 1500 (2013) : Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec • Rapport SN 16983 du 29/07/2014 – Laboratoire Hygcen - Prof. Med. H.-P. Werner • Rapport 2014-103 du 29/09/2014 - Laboratoire UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) - Dr. Med. B. Christiansen
Désinfection chirurgicale	pr EN 12791 (2013) : Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 × 45 sec • Rapport SN 16669 du 23/04/2014 – Laboratoire Hygcen - Prof. Med. H.-P. Werner • Rapport du 25/08/2014 – Laboratoire W.H.U. (Wasser Hygiene Umwelt) - Dr. A. Sorger

*Recommandations WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009.

Private Organizations for Patient Safety

UNE COLLABORATION AVEC L'OMS PROGRAMME DE SÉCURITÉ DES PATIENTS

Les Laboratoires ANIOS sont membres depuis mai 2012 de l'Organisation Privée pour la Sécurité des Patients (POPS), programme lancé par l'OMS qui vise à regrouper des industriels de l'hygiène dans un seul but : exploiter l'expertise de chacun pour améliorer la mise en œuvre des recommandations de l'OMS pour la sécurité des patients. Cette collaboration a comme seul objectif de réduire le nombre d'infections associées aux soins, notamment par l'amélioration de l'hygiène des mains dans les différentes parties du monde, y compris les pays les moins développés.

2002
MANUGEL 85 NPC

Gel thixotropique avec Éthanol et Phénoxyéthanol.

2005
ANIOSGEL 85 NPC
ANIOSRUB 85 NPC

Gel et solution hydroalcooliques renforcés en agent hydratant.

2015
ANIOSGEL 800

7 ACTIONS POUR UNE FRICTION

Désinfection hygiénique : verser la quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant **30 secondes**, selon le protocole ci-dessous et jusqu'à séchage complet.



Désinfection chirurgicale : verser la quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant **2 x 45 secondes**, selon le protocole officiel ci-dessus en incluant la désinfection des avant-bras.

EX2550-2015.05A - Photos non contractuelles - Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
Produits biocides. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DOUCEUR ET PERFORMANCE

Scannez pour découvrir le film

POUR COMMANDER ANIOSGEL 800

100 flacons de 30ml	**2550.651**
20 flacons de 75 ml	**2550.274**
6 flacons de 300 ml avec pompe vissée	**2550.366**
12 flacons de 500 ml pompe vissée	**2550.636**
12 flacons carrés de 500 ml pour distributeur	**2550.639**
12 flacons de 1L pompe vissée	**2550.637**
12 flacons de 1L airless	**2550.638**

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes - FRANCE
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax. +33 3 20 05 27 48
www.anios.com

Laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection